泌尿器科 前立腺癌

投与間隔　：　7　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																											
				1	2	3	4	5	6	7																					
CDDP単剤	シスプラチン	注	30　mg/m^2	○																											
	備考																														
	副作用		骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、口内炎、腎機能障害など																												

泌尿器科 前立腺癌

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
ドセタキセル＋ステロイド	ドセタキセル	注	70　mg/m^2		○																											
	プレドニゾロン	内服	10 (mg/日)	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	備考		ステロイドはデキサメタゾン 1mg/日を用いる場合あり																													
	副作用		骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、浮腫など																													
ジェブタナ＋ステロイド	ジェブタナ	注	20　mg/m^2		○																											
	プレドニゾロン	内服	10 (mg/日)	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	備考		ステロイドはデキサメタゾン 1mg/日を用いる場合あり																													
	副作用		骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感など																													
ドセタキセル	ドセタキセル	注	75　mg/m^2		○																											
	ニュベクオ	内服	1200	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

| | | |