

+CBDCA	備考	6コースまで									
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、しびれ、関節痛・筋肉痛、アレルギーなど									
VNR	口ゼウス	注	25	mg/m ²	○						
	備考										
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、血管痛など									
アバスチン (維持)	アバスチン	注	15	mg/kg	○						
	備考	維持療法									
	副作用	高血圧、蛋白尿、出血など									
アバスチン+ CBDCA +PEM	アバスチン	注	15	mg/kg	○						
	アリムタ	注	500	mg/m ²	○						
	カルボプラチン	注	5	AUC	○						
	備考	6コースまで、その後維持療法へ									
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、アレルギー、高血圧、蛋白尿、出血など									
アバスチン +PEM (維持)	アバスチン	注	15	mg/kg	○						
	アリムタ	注	500	mg/m ²	○						
	備考	維持療法									
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、高血圧、蛋白尿、出血など									
アバスチン +CBDCA +PTX	アバスチン	注	15	mg/kg	○						
	パクリタキセル	注	200	mg/m ²	○						
	カルボプラチン	注	6	AUC	○						
	備考	6コースまで、その後維持療法へ									
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、しびれ、関節痛・筋肉痛、アレルギー、高血圧、蛋白尿、出血など									
キイトルーダ (3週毎)	キイトルーダ	注	200	mg	○						
	備考										
	副作用	免疫関連有害事象									
テセントリク	テセントリク	注	1200	mg	○						
	備考										
	副作用	免疫関連有害事象									

レジメン名	商品名	剤形	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク+ CBDCA+VP-16	テセントリク	注	1200 mg	○																				
	エトポシド	注	100 mg/m ²	○	○	○																		
	カルボプラチン	注	5 AUC	○																				
	備考	4コースまで、その後維持療法へ																						
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、アレルギー、免疫関連有害事象など																						
イミフィンジ+ CBDCA+VP-16	イミフィンジ	注	1500 mg	○																				
	エトポシド	注	100 mg/m ²	○	○	○																		
	カルボプラチン	注	5 AUC	○																				
	備考	4コースまで、その後維持療法へ																						
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、アレルギー、免疫関連有害事象など																						
イミフィンジ+ CDDP+VP-16	イミフィンジ	注	1500 mg	○																				
	エトポシド	注	100 mg/m ²	○	○	○																		
	シスプラチン	注	80 mg/m ²	○																				
	備考	4コースまで、その後維持療法へ																						
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、腎機能障害、免疫関連有害事象など																						

投与間隔 : 28 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
AMR	カルセド	注	40 mg/m ²	○	○	○																									
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感など																													
CBDCA+CPT-11	イリノテカン	注	50 mg/m ²	○							○							○													
	カルボプラチン	注	5 AUC	○																											
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、下痢、口内炎、倦怠感、アレルギーなど																													

無断転載禁止