血液内科　白血病

投与期間：未設定

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
マイロターグ	マイロターグ	注	9　mg/m^2	○														○													
	備考	3-6mg/m^{2}に減量することもあり																													
	副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、下痢、口内炎、倦怠感、肝機能障害、infusion reacitonなど																													
HAM	シタラビン	注	2000　mg/m^2	○	○	○	○																								
				○	○	○	○																								
	ノバントロン	注	10　mg/m^2	○	○																										
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、皮膚障害、肝機能障害、心機能障害、結膜炎など																													
CA（G）	キロサイド	注	20　mg/m^2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
	アクラシノン	注	14　mg/m^2	○	○	○	○																								
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、皮膚障害、心機能障害など																													

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																										
アーゼラ **販売中止？**	アーゼラ	注	(初回) 300　mg																											
			(以降) 2000　mg																											
	備考	初回は300mg・2-8回目は2000mgを1週間隔、以降4週間隔で9-12回目投与、詳細は添付文書参照																												
	副作用																													

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																										

ベスポンサ	ベスポンサ	注	0.8 mg/m^2	○	
			0.5 mg/m^2		○ ○
	備考	寛解が得られた場合は、2サイクル目から0.5mg/m^{2}で投与 投与間隔は1サイクル目は21-28日、2サイクル目以降は28日			
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、肝機能障害、infusion reacitonなど			

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ld-Ara-C+ ベネクレクスタ	キロサイド	注	20 mg/m^2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ベネクレクスタ	注	100～600 mg										
	備考	ベネトクラクスとして、用量漸増期は1日毎に100mg→200mg→400mg→600mg/日(1日1回)経口投与。その後の維持投与期は、600mg/日(1日1回)経口投与。											
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢など											

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Augmented Hyper-CVAD	エンドキサン	注	300 mg/m^2	○	○	○																		
	ドキソルビシン	注	50 mg/m^2				○																	
	オンコビン	注	2 mg/body	○							○							○						
	ロイナーゼ	注	4 V/body		○							○							○					
	デキサート	注	66 mg	○	○	○	○											○	○	○	○			
	備考																							
	副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、心機能障害、急性膵炎、アレルギーなど																						

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ビーリンサイト	ビーリンサイト	注	18 μg	○	→	○	→	○	→	○																					
	ビーリンサイト	注	28 μg								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	備考	
	副作用	骨髄抑制、サイトカイン放出症候群、神経学的事象（脳神経障害、痙攣発作、錯乱状態、失語症など）など

JALSG AML201

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
寛解導入療法	イダマイシン	注	12 mg/m^2	○	○	○																									
	キロサイド	注	100 mg/m^2	○	○	○	○	○	○	○																					
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、脱毛、口内炎、皮膚障害、心機能障害など																													
寛解導入療法	ダウノマイシン	注	50 mg/m^2	○	○	○	○	○																							
	キロサイド	注	100 mg/m^2	○	○	○	○	○	○	○																					
	備考	ダウノマイシンは年齢などにより短縮可																													
		骨髄抑制、悪心、下痢、脱毛、口内炎、皮膚障害、心機能障害など																													
HD Ara-C	シタラビン	注	2000 mg/m^2	○	○	○	○	○																							
				○	○	○	○	○																							
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、脱毛、口内炎、皮膚障害、心機能障害など																													
地固め1コース	ノバントロン	注	7 mg/m^2	○	○	○																									
	キロサイド	注	200 mg/m^2	○	○	○	○	○																							
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、脱毛、口内炎、皮膚障害、心機能障害など																													
地固め2コース	ダウノマイシン	注	50 mg/m^2	○	○	○																									
	キロサイド	注	200 mg/m^2	○	○	○	○	○																							
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、脱毛、口内炎、皮膚障害、心機能障害など																													
	アクラシノン	注	20 mg/m^2	○	○	○	○	○																							

地固め3コース	キロサイド	注	200 mg/m^2	○	○	○	○	○																												
	備考																																			
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、脱毛、口内炎、皮膚障害、心機能障害など																																		
地固め4コース	エトポシド	注	100 mg/m^2	○	○	○	○	○																												
	キロサイド	注	200 mg/m^2	○	○	○	○	○																												
	オンコビン	注	0.8 mg/m^2								○																									
	フィルデシン	注	2 mg/m^2										○																							
	備考																																			
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、脱毛、口内炎、しびれ、皮膚障害、心機能障害など																																		

JALSG APL212

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
寛解導入療法B群	イダマイシン	注	12 mg/m^2	○	○																															
	キロサイド	注	100 mg/m^2	○	○	○	○	○																												
	備考	ATRA（ベサノイド）45mg/m^{2}をday1～地固め療法開始まで内服（最長60日）																																		
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、脱毛、口内炎、皮膚障害、心機能障害など																																		
寛解導入療法C群	イダマイシン	注	12 mg/m^2	○	○	○																														
	キロサイド	注	100 mg/m^2	○	○	○	○	○	○	○																										
	備考	ATRA（ベサノイド）45mg/m^{2}をday1～地固め療法開始まで内服（最長60日）																																		
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、脱毛、口内炎、皮膚障害、心機能障害など																																		
寛解導入療法D群	イダマイシン	注	12 mg/m^2	○	○	○																														
	キロサイド	注	100 mg/m^2	○	○	○	○	○	○	○																										
	備考	A群→D群　追加投与																																		
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、脱毛、口内炎、皮膚障害、心機能障害など																																		
寛解導入療法D群	イダマイシン	注	12 mg/m^2	○																																
	キロサイド	注	100 mg/m^2	○	○																															

| | | |

| | | |

	備考	ロイケリンはday29～42のねる前に内服、デキサートはデキサメタゾンリン酸エステルとして4mg
	副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、下痢、脱毛、しびれ、倦怠感、出血性膀胱炎、心機能障害など

JALSG ALL202-U

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																											
					1	…	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	35
寛解導入療法	プレドニン	内服	60	mg/m^2	○	○	○																									
	デキサート	注	10	mg/m^2				○	○	○	○	○	○	○																		
	プレドニン	内服	40	mg/m^2											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	プレドニン	内服	10	mg/m^2																									○	○	○	
	オンコビン	注	1.5	mg/m^2				○								○								○							○	
	テラルビシン	注	25	mg/m^2				○	○																							
	エンドキサン	注	1200	mg/m^2						○																						
	ロイナーゼ	注	6000	U/m^2											○		○		○		○		○		○		○		○			
	メソトレキセート	髄注	12	mg/body	○			○			(○)				(○)							○										
	キロサイド	髄注	30	mg/body				○			(○)				(○)							○										
	ソル・コーテフ	髄注	25	mg/body				○			(○)				(○)							○										
	備考	中枢神経浸潤がある場合は、髄腔内投与をday11、15に追加																														
	副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、出血性膀胱炎、心機能障害、急性膵炎、アレルギーなど																														

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
地固め療法	エンドキサン	注	750	mg/m^2	○							○																				
	テラルビシン	注	25	mg/m^2	○	○																										
	キロサイド	注	75	mg/m^2	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○															
	ロイケリン	内服	50	mg/m^2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
	メソトレキセート	髄注	12	mg/body	○							○																				
	キロサイド	髄注	30	mg/body	○							○																				

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

JALSG Ph+ ALL219

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	・	14	15	・	・	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
強化地固め療法	エンドキサン	注	1200 mg/m^2	○																											
	ダウノマイシン	注	45 mg/m^2	○	○	○																									
	オンコビン	注	1.3 mg/m^2	○							○			○				○													
	プレドニン	内服	60 mg/m^2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
	スプリセル	内服	100 mg/body				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	メソトレキセート	髄注	15 mg/body	○																											
	デキサート	髄注	3.3 mg/body	○																											
	備考	プレドニンはday1～21に1日3回に分けて内服し、以降漸減。スプリセルはday4～31に1日1回朝食後に内服。																													
	副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、下痢、脱毛、しびれ、倦怠感、出血性膀胱炎、皮膚障害、体液貯留、QT延長、心機能障害など																													
地固め1コース	メソトレキセート	注	1000 mg/m^2	○																											
	シタラビン	注	2000 mg/m^2		○	○																									
					○	○																									
	ソル・メドロール	注	50 mg/body	○	○	○																									
				○	○	○																									
	スプリセル	内服	100 mg/body				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
	メソトレキセート	髄注	15 mg/body	○																											
	デキサート	髄注	3.3 mg/body	○																											
	備考	スプリセルはday4～24に1日1回朝食後に内服（病状次第でアイクルシグに変更可）。																													
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、口内炎、皮膚障害、体液貯留、QT延長、肝機能障害、心機能障害、結膜炎など																													
	エンドキサン	注	1200 mg/m^2	○																											
	ダウノマイシン	注	45 mg/m^2	○																											
	オンコビン	注	1.3 mg/m^2	○																											
	プレドニン	内服	60 mg/m^2	○	○	○	○	○	○	○																					

| | | |

髄注	キロサイド	髄注	40	mg/body																											
	プレドニン	髄注	10	mg/body																											
	備考																														
	副作用																														
地固め療法	トリセノックス	注	0.15	mg/kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
	ベサノイド	内服	45	mg/m^2	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○									
	備考	トリセノックスは4週間で20日間投与し4週間休薬を1コースとし計4コース投与。 ベサノイドは14日間投与し2週間休薬を1コースとし計7コース投与。																													
	副作用	骨髄抑制、悪心、皮膚障害、肝機能異常、QT延長、不整脈、レチノイン酸症候群など																													

JALSG CBF-AML220

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
GO+HD Ara-C	マイローダ	注	3	mg/m^2	○																										
	シタラビン	注	2000	mg/m^2		○	○	○	○	○																					
						○	○	○	○	○																					
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、脱毛、口内炎、皮膚障害、肝機能障害、心機能障害、infusion reactionなど																													

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ガザイバ +カルケンス	ガザイバ	注	100	mg	○																										
			900	mg		○																									
			1000	mg								○							○												
	カルケンス	内服	100	mg/回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

| | | |