消化器内科　肝臓癌

投与間隔　：　14　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
サイラムザ	サイラムザ	注	8	mg/kg	○													
	備考																	
	副作用	インフュージョンリアクション、高血圧、尿蛋白、出血など																

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク＋アバスチン	テセントリク	注	1200	mg/kg	○																				
	アバスチン	注	15	mg/kg	○																				
	備考																								
	副作用	免疫関連有害事象、尿蛋白、高血圧、出血など																							

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イジュド＋イミフィンジ	イジュド	注	300	mg	○																											
	イミフィンジ	注	1500	mg	○																											
	備考																															
	副作用	免疫関連有害事象、間質性肺炎、下痢、甲状腺機能障害など																														