泌尿器科 腎癌

投与間隔　：　7　日

| レジメン名 | 商品名 | 剤形 | 投与量 | | スケジュール　（日） | | |

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
オプジーボ＋ヤーボイ	オプジーボ	注	240	mg	○																											
	ヤーボイ	注	1	mg/kg	○																											
	備考																															
	副作用	免疫関連有害事象																														
キイトルーダ（3週毎）＋インライタ	キイトルーダ	注	200	mg	○																											
	インライタ	内服	10 (mg/日)	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	備考																															
	副作用	高血圧、下痢、手足症候群、倦怠感、甲状腺機能障害、免疫関連有害事象など																														
キイトルーダ（3週毎）	キイトルーダ	注	200	mg	○																											
	備考																															
	副作用	免疫関連有害事象																														
キイトルーダ（3週毎）＋レンビマ	キイトルーダ	注	200	mg	○																											
	レンビマ	内服	20	mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	備考																															
	副作用	高血圧、下痢、皮疹、倦怠感、甲状腺機能障害、免疫関連有害事象など																														

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オプジーボ（4週毎）	オプジーボ	注	480	mg	○																											
	備考																															
	副作用	免疫関連有害事象																														

| | | |