









<b>DKd</b> <b>(皮下投与)</b> <b>(2コース目以降)</b>	デキサメタゾン	注	20	mg	<input type="checkbox"/>											
		内服	20	mg	<input type="checkbox"/>											
	備考	デキサメタゾンは静脈内投与可・適宜減量 ダラキューロは、3-6コース目はday1とday15、7コース目以降はday1に投与														
	副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、下痢、しびれ、倦怠感、高血圧、腎機能障害、心機能障害、血栓症、infusion reactionなど														
<b>サークリサ+Pd</b>	サークリサ	注	10	mg/kg	<input type="checkbox"/>											
	ポマリスト	内服	4	mg	<input type="checkbox"/>											
	デキサメタゾン	注	40	mg	<input type="checkbox"/>											
	備考	ポマリストは適宜減量、デキサメタゾンは内服可・適宜減量 サークリサは、2コース目以降はday1とday15に投与														
	副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、下痢、しびれ、倦怠感、皮膚障害、腎機能障害、心機能障害、血栓症、infusion reactionなど														
<b>サークリサ+DEX</b>	サークリサ	注	20	mg/kg	<input type="checkbox"/>											
	デキサメタゾン	注	40	mg	<input type="checkbox"/>											
	備考	デキサメタゾンは内服可・適宜減量 サークリサは、2コース目以降はday1とday15に投与														
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、倦怠感、infusion reactionなど														
<b>サークリサ単剤</b>	サークリサ	注	20	mg/kg	<input type="checkbox"/>											
	備考	サークリサは、2コース目以降はday1とday15に投与														
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、倦怠感、infusion reactionなど														
<b>DPd</b>	ダラキューロ	注	1800	mg	<input type="checkbox"/>											
	ポマリスト	内服	4	mg	<input type="checkbox"/>											
	デキサメタゾン	内服	40	mg	<input type="checkbox"/>											
	備考	ポマリスト、デキサメタゾンは適宜減量 ダラキューロは、3-6コース目はday1と15、7コース目以降はday1に投与														
	副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、下痢、しびれ、皮膚障害、腎機能障害、心機能障害、血栓症、infusion reactionなど														
	サークリサ	注	10	mg/kg	<input type="checkbox"/>											



