

	備考																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、口内炎、手足症候群、心機能障害、高血圧、尿蛋白、出血など																		
GEM	ゲムシタビン	注	1000	mg/m ²	○															
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、血管痛など																		
ドキシル+ CBDCA	ドキシル	注	30	mg/m ²	○															
	カルボプラチン	注	5	AUC	○															
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、口内炎、手足症候群、心機能障害、アレルギー、高血圧、尿蛋白、出血など																		
ドキシル単剤	ドキシル	注	40	mg/m ²	○															
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、口内炎、手足症候群、心機能障害など																		
CPT-11単剤	イリノテカン	注	100	mg/m ²	○															
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、下痢、倦怠感など																		
PTX Weekly	パクリタキセル	注	80	mg/m ²	○															
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、脱毛、倦怠感、しびれ、関節痛・筋肉痛、アレルギーなど																		
CPT-11 Biweekly	イリノテカン	注	150	mg/m ²	○															
	備考	子宮頸癌専用レジメン																		
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、下痢、倦怠感など																		
Bev+ドキシル +CBDCA	アバスチン	注	15	mg/kg	○															
	ドキシル	注	30	mg/m ²	○															
	カルボプラチン	注	5	AUC	○															
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、吐き気、口内炎、手足症候群、心機能障害、アレルギー、高血圧、尿蛋白、出血など																		