消化器内科　膵癌

投与間隔　：　14　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FOLFIRINOX（modified）	オキサリプラチン	注	85　mg/m^2	○													
	レボホリナート	注	200　mg/m^2	○													
	イリノテカン	注	150　mg/m^2	○													
	フルオロウラシル（46時間持続）	注	2400　mg/m^2	○	→	→											
	備考																
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、脱毛、口内炎、しびれ、アレルギーなど															
オニバイド＋5-FU+LV	オニバイド	注	70　mg/m^2	○													
	レボホリナート	注	200　mg/m^2	○													
	フルオロウラシル（46時間持続）	注	2400　mg/m^2	○	→	→											
	備考																
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚異常、下痢、脱毛、口内炎など															

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21															
TS-1+GEM	エスワン	内服	80-120(mg)	朝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																					
				夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																					
	ゲムシタビン	注	1000　mg/m^2		○							○																											
	備考																																							

	副作用	骨髄抑制、下痢、血管痛、流涙など

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
GEM	ゲムシタビン	注	1000　mg/m^2	○							○							○													
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、血管痛など																													
GEM＋nab-PTX	アブラキサン	注	125　mg/m^2	○							○							○													
	ゲムシタビン	注	1000　mg/m^2	○							○							○													
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、脱毛、しびれ、血管痛、筋肉痛・関節痛など																													

薬剤師啓蒙研究会