

	備考												
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、脱毛、口内炎、皮膚障害、インフュージョンリアクション、低Mg血症など											
アービタックス (隔週) +mFOLFOX6	アービタックス	注	500	mg/m ²	○								
	オキサリプラチン	注	85	mg/m ²	○								
	レボホリナート	注	200	mg/m ²	○								
	フルオロウラシル (急速)	注	400	mg/m ²	○								
	フルオロウラシル (46時間持続)	注	2400	mg/m ²	○	→	→						
	備考												
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、しびれ、皮膚障害、過敏症・インフュージョンリアクション、低Mg血症など											
アービタックス +CPT-11 Biweekly	アービタックス	注	(初回)400mg/m ² (以降)250mg/m ²		○			○				○	
	イリノテカン	注	150	mg/m ²	○								
	備考												
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、脱毛、口内炎、皮膚障害、インフュージョンリアクション、低Mg血症など											
アービタックス +FOLFIRI	アービタックス	注	(初回)400mg/m ² (以降)250mg/m ²		○			○				○	
	イリノテカン	注	150	mg/m ²	○								
	レボホリナート	注	200	mg/m ²	○								
	フルオロウラシル (急速)	注	400	mg/m ²	○								
	フルオロウラシル (46時間持続)	注	2400	mg/m ²	○	→	→						
	備考												
	副作用	骨髄抑制、吐き気、味覚障害、下痢、脱毛、口内炎、皮膚障害、インフュージョンリアクション、低Mg血症など											
	アービタックス	注	(初回)400mg/m ² (以降)250mg/m ²		○			○				○	

