

CHOP	プレドニン	内服	60 mg/m ²	朝 昼	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○															
	エンドキサン	注	750	mg/m ²	○															
	ドキシソルビシン	注	50	mg/m ²	○															
	オンコビン	注	1.4	mg/m ²	○															
	備考	プレドニン：最大100mg/日、適宜減量あり																		
	副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、心機能障害など																		
R-CHOP	プレドニン	内服	60 mg/m ²	朝 昼	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○															
	リツキシマブ	注	375	mg/m ²	○															
	エンドキサン	注	750	mg/m ²	○															
	ドキシソルビシン	注	50	mg/m ²	○															
	オンコビン	注	1.4	mg/m ²	○															
	備考	プレドニン：最大100mg/日、適宜減量あり。リツキシマブはCHOPと別日に投与する場合あり																		
副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、心機能障害、infusion reactionなど																			
R-miniCHOP	プレドニン	内服	60 mg/日	朝 昼	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○															
	リツキシマブ	注	375	mg/m ²	○															
	エンドキサン	注	400	mg/m ²	○															
	ドキシソルビシン	注	25	mg/m ²	○															
	オンコビン	注	1	mg/body	○															
	備考	プレドニン：最大60mg/日、適宜減量あり。リツキシマブはCHOPと別日に投与する場合あり																		
副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、心機能障害、infusion reactionなど																			
CHASE	デキサート	注	5	V	○ ○ ○															
	エンドキサン	注	1200	mg/m ²	○															
	エトポシド	注	100	mg/m ²	○ ○ ○															
	シタラビン	注	2000	mg/m ²	○ ○															
	備考																			

	備考	デキサメタゾン は内服でも可																		
	副作用	骨髄抑制、悪心、倦怠感、腎機能障害、肺機能障害、血管痛など																		
R-GDP	リツキシマブ	注	375	mg/m ²	○															
	デキサート	注	5	V	○	○	○	○												
	ゲムシタビン	注	1000	mg/m ²	○				○											
	シスプラチン	注	75	mg/m ²	○															
	備考	デキサメタゾン は内服でも可、リツキシマブ はGDP と同日に投与する場合あり																		
	副作用	骨髄抑制、悪心、倦怠感、腎機能障害、肺機能障害、血管痛、infusion reaction など																		
DeVIC	デキサート	注	5	V	○	○	○													
	エトポシド	注	100	mg/m ²	○	○	○													
	イホマイド	注	1500	mg/m ²	○	○	○													
	カルボプラチン	注	300	mg/m ²	○															
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、悪心、脱毛、口内炎、倦怠感、出血性膀胱炎、腎機能障害、アレルギー など																		
R-DeVIC	リツキシマブ	注	375	mg/m ²	○															
	デキサート	注	5	V	○	○	○													
	エトポシド	注	100	mg/m ²	○	○	○													
	イホマイド	注	1500	mg/m ²	○	○	○													
	カルボプラチン	注	300	mg/m ²	○															
	備考	リツキシマブ はDeVIC と同日に投与する場合あり																		
	副作用	骨髄抑制、悪心、脱毛、口内炎、倦怠感、出血性膀胱炎、腎機能障害、アレルギー、infusion reaction など																		
EPOCH	プレドニン	内服	60	mg/m ²	朝	○	○	○	○	○										
					昼	○	○	○	○	○										
	エトポシド	注	50	mg/m ²	○	○	○	○												
	オンコビン	注	0.4	mg/m ²	○	○	○	○												
	ドキシソルビシン	注	10	mg/m ²	○	○	○	○												
	エンドキサン	注	750	mg/m ²					○											
	備考	プレドニン：最大100mg/日、適宜減量あり。																		

ポライビー ± R-CHP	リツキシマブ	注	375	mg/m ²	○															
	エンドキサン	注	750	mg/m ²	○															
	ドキシソルビシン	注	50	mg/m ²	○															
	ポライビー	注	1.8	mg/kg	○															
備考	プレドニン：最大100mg/日、適宜減量あり。 リツキシマブはポライビー+CHPと別日に投与する場合あり。																			
副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、心機能障害、infusion reactionなど																			
G-CHOP	プレドニン	内服	60	mg/m ²	朝	○	○	○	○	○										
					昼	○	○	○	○	○										
	ガザイバ	注	1000	mg/m ²		○					○								○	
	エンドキサン	注	750	mg/m ²		○														
	ドキシソルビシン	注	50	mg/m ²		○														
	オンコビン	注	1.4	mg/m ²		○														
備考	プレドニン：最大100mg/日、適宜減量あり。 2コース目以降はエンドキサン、ドキシソルビシン、オンコビンもDay1に投与。																			
副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、心機能障害、infusion reactionなど																			
Escalated BEACOPP	プレドニン	内服	40	mg/m ²		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	プロカルバジン	内服	100	mg/m ²		○	○	○	○	○	○	○								
	エトポシド	注	200	mg/m ²		○														
	ブレオ	注	10	mg/m ²							○									
	ドキシソルビシン	注	35	mg/m ²		○														
	オンコビン	注	1.4	mg/m ²							○									
	エンドキサン	注	1200	mg/m ²		○														
備考																				
副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、出血性膀胱炎、肺機能障害、心機能障害、infusion reactionなど																			
ダルビアス単剤	ダルビアス	注	300	mg/m ²		○	○	○	○	○										
	備考																			
	副作用	骨髄抑制、悪心、味覚異常、しびれ、皮膚障害、心機能障害など																		

投与間隔 : 28 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ABVD	ドキシソルビシン	注	25 mg/m ²	○																											
	ブレオ	注	10 mg/m ²	○																											
	エクザール	注	6 mg/m ²	○																											
	ダカルバジン	注	375 mg/m ²	○																											
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、血管痛、肺機能障害、心機能障害など																													
A+AVD	アドセトリス	注	1.2 mg/kg	○																											
	ドキザゾシン	注	25 mg/m ²	○																											
	エクザール	注	6 mg/m ²	○																											
	ダカルバジン	注	375 mg/m ²	○																											
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、血管痛、肺機能障害、心機能障害、infusion reactionなど																													
トレアキシ ン/リツキシマブ	トレアキシ ン	注	90 mg/m ²	○	○																										
	リツキシマ ブ	注	375 mg/m ²	○																											
	備考	リツキシマブはトレアキシ ンと別日に投与する場合あり																													
	副作用	骨髄抑制、悪心、皮膚障害、血管痛、infusion reactionなど																													
トレアキシ ン	トレアキシ ン	注	120 mg/m ²	○	○																										
	備考																														
	副作用	骨髄抑制、悪心、皮膚障害、血管痛など																													
トレアキシ ン/ガザイバ	トレアキシ ン	注	90 mg/m ²	○	○																										
	ガザイバ	注	1000 mg	○																											
	備考	2コース目からガザイバはday1のみ投与、ガザイバはトレアキシ ンと別日に投与する場合あり																													
	副作用	骨髄抑制、悪心、皮膚障害、血管痛、infusion reactionなど																													

<u>SMILE</u>	イホマイド	注	1500	mg/m ²		○	○	○																	
	エトポシド	注	100	mg/m ²		○	○	○																	
	備考	骨髄抑制、悪心、下痢、脱毛、口内炎、倦怠感、出血性膀胱炎、腎機能障害、急性膵炎、アレルギーなど																							
<u>エプキンリ</u>	エプキンリ	注	0.16	mg		○																			
		注	0.8	mg									○												
		注	48	mg																○				○	
	備考	2-3コース目はday1,8,15,22、4-9コース目はday1,15、10コース目以降はday1に48mgを投与。																							
	副作用	骨髄抑制、間質性肺炎、サイトカイン放出症候群など																							

投与間隔 : 未設定

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<u>HD Ara-C (PCNSL)</u>	シタラビン	注	3000	mg/m ²		○	○																								
	備考	骨髄抑制、悪心、下痢、口内炎、皮膚障害、肝機能障害、結膜炎など																													
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、口内炎、皮膚障害、肝機能障害、結膜炎など																													
<u>Hyper-CVAD</u>	エンドキサン	注	300	mg/m ²		○	○	○																							
	オンコビン	注	2	mg																											
	ドキシソルビシン	注	50	mg/m ²																											
	デキサメタゾン	注	40	mg		○	○	○	○																						
	備考	デキサメタゾンは内服でも可。																													
	副作用	骨髄抑制、悪心、便秘、脱毛、しびれ、倦怠感、心機能障害など																													
<u>MTX+Ara-C</u>	メソトレキセート	注	1000	mg/m ²		○																									
	シタラビン	注	2000	mg/m ²			○	○																							
	備考																														

	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、口内炎、皮膚障害、肝機能障害、結膜炎など		
HD-MTX	メソトレキセート	注	3500 mg/m ²	○
	備考			
	副作用	骨髄抑制、悪心、下痢、口内炎、肝機能障害など		
ガザイバ (維持)	ガザイバ	注	1000 mg	○
	備考	ガザイバ単独投与時は2ヶ月に1回投与。最長2年間投与。		
	副作用	infusion reactionなど		

無断転載禁止